

<b>Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen (SRS-2)</b>	<p>Roeyers R., Thys M., Druart C., De Schrijver M., Schittekatte M, Hogrefe, Amsterdam, 2015</p> <p>Opgenomen in de Specifieke Diagnostische Protocol Gedrag en Emotie</p>
Doel of meetpretentie	<p>Meten/screening van de ernst van sociale beperkingen die gepaard gaan met autismespectrumstoornissen Beoordelen van de dimensies: interpersoonlijk gedrag, communicatie en repetitief/stereotiep gedrag</p> <p>Bruikbaar bij onderkende en/of indicerende onderzoeksvragen (zie ook Overzicht testmateriaal Gedrag en Emotie)</p>
Subschalen/dimensies	<p>Bij gebruik van de SRS in het kader van screening en diagnose staat de totaalscore centraal. De vijf SRS behandelschalen zijn: sociaal bewustzijn, sociale cognitie, sociale communicatie, sociale motivatie, autistische preoccupaties. De behandelschalen zijn nuttig bij het ontwerpen en evalueren (be)handelprogramma's. Daarnaast zijn er twee DSM-5 subschalen die aansluiten bij de onderverdeling van symptomen in de DSM-5.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sociale communicatie en interactie</li> <li>• Stereotiepe gedragingen en interesses</li> </ul>
Informatiebron	ouder / verzorger (geen normen voor leerkracht)
Doelgroep/normgroep	versie voor 3-jarigen en een versie voor 4 tot 18-jarigen
Jaar normen, steekproef	<p>2008 t/m 2009 Voor de versie 4 – 18-jarigen zijn er aparte normen voor jongens en meisjes voor de Vlaamse algemene populatie. De meerderheid van de 370 Vlaamse kinderen uit de algemene populatie is afkomstig uit West- en Oost-Vlaanderen. De representativiteit van de steekproef wordt weinig gespecificeerd in de handleiding. Voor de autismespectrumgroep (238 kinderen, van 4 tot 18 jaar) zijn er geen aparte normen per leeftijd, per geslacht, Nederland of Vlaanderen omdat er geen significante verschillen werden gevonden. Voor de 3-jarigen zijn er enkel (recentere) Nederlandse normen.</p>
Afnamewijze en duur	<p>Vragenlijst, screeningsinstrument, individueel, ongeveer 15 minuten</p> <p>De SRS-2 kan ook digitaal worden afgenomen via Hogrefe Teststelsel (HTS 5).</p>
Bijkomende info	<p>Nederlandstalige bewerking van de Social Responsiveness Scale, second edition van J.N. Constantino, .</p> <p>De versie en de normen voor de 4- tot 18-jarigen is dezelfde als die van 2011, enkel de behandelschalen werden herschikt zodat ze aansluiten bij DSM-5. De vragenlijst voor 3-jarigen is nieuw, maar werd enkel in Nederland genormeerd en onderzocht en kan volgens CAP beter niet gebruikt worden. Voor een Vlaamse CLB-medewerker heeft het dus weinig zin om de SRS-2 aan te kopen wanneer men al over de SRS beschikt.</p>

<b>Beoordeling</b>	
CAP	<p><u>2016</u>            Deze beoordeling gaat over de psychometrische kenmerken van de <b>SRS</b>. Het is geen beoordeling van de versie voor 3-jarigen  <b>Normen:</b> Recent, +/-  <b>Betrouwbaarheid:</b> interne consistentie zeer goed voor alle steekproeven  <b>Validiteit:</b>            concurrente validiteit (met ADI-R): correlatie is hoog voor de totaalscore (.63) en redelijk hoog voor de subschalen.            Een ROC-analyse toont aan dat het discriminerend vermogen van de SRS uitstekend is.</p> <p>Zie CAP-vademecum voor een gedetailleerde analyse van de validiteit en betrouwbaarheid</p>
COTAN	2012 zie diagnostische fiche SRS
Faire diagnostiek	Geen informatie
Beoordeling Prodia	<p>2<sup>e</sup> keuze.            Voor een Vlaamse diagnost heeft het weinig zin om de SRS-2 aan te kopen wanneer men al over de SRS beschikt.            COTAN-beoordeling SRS is strenger dan CAP-vademecum</p>
Datum opmaak fiche	December 2017